


A sífilis pode ser tratada?

Sim, a sífilis é geralmente tratada com antibióticos. Mesmo após ter passado por tratamento, você pode ser infectado novamente. É importante usar camisinha toda vez que você fizer sexo para reduzir o risco de contrair sífilis e outras ISTs.

O meu parceiro precisa passar por tratamento?

Sim. Se você tiver contato sexual com um parceiro que não passou por tratamento, você pode ser infectado novamente.



O que acontece se a sífilis não for tratada?

Se não for tratada, a sífilis pode causar problemas sérios de saúde. Se a infecção ficar muito tempo sem ser tratada, os órgãos internos podem ser afetados. Além disso, pessoas com sífilis têm mais propensão a contrair o VIH caso sejam expostas ao vírus.

A sífilis pode afetar tanto uma mulher grávida quanto o feto?

Sim. A sífilis pode causar sérios problemas de saúde, tanto para uma mulher grávida quanto para o feto.

Como você pode se proteger contra a sífilis?

A única maneira 100% eficaz de se proteger contra a sífilis é não fazendo sexo. Você pode diminuir o risco de contrair sífilis ou outra IST tomando as seguintes medidas:

- Sempre use uma camisinha de látex ou poliuretano ou uma camisinha bucal quando fizer sexo oral, anal ou vaginal.
- Camisinhas feitas de materiais “naturais” podem proteger contra a gravidez, mas **NÃO CONTRA AS ISTs**.
- Reduza o número de parceiros.
- Converse com o seu parceiro sobre as ISTs e peça que ele faça um exame.
- Converse com o seu médico sobre práticas sexuais seguras e solicite um exame.
- Lembre-se que fazer sexo sob influência de drogas e/ou álcool aumenta a chance de você fazer sexo sem proteção.

Para mais informações, acesse:

<http://www.bphc.org/whatwedo/sexual-health>
ou <http://www.cdc.gov/std>

Sífilis



Boston Public Health Commission
Infectious Disease Bureau
1010 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02118
www.bphc.org
617-534-5611

Portuguese

O que é a sífilis?

A sífilis é uma infecção transmitida sexualmente (IST), causada por uma bactéria.

Como uma pessoa contrai sífilis?

A sífilis é transmitida de pessoa para pessoa por meio de uma ferida na pele. As feridas da sífilis podem estar na vagina, no pênis, no ânus, na boca, nos lábios ou no reto e a doença pode ser transmitida através do sexo oral, anal ou vaginal. A sífilis pode ser transmitida mesmo que a ferida não possa ser vista ou percebida. Assim, as pessoas podem transmitir sífilis mesmo sem saber que estão infectadas. Uma mulher grávida também pode passar a sífilis para o feto.

Você tem grandes chances de contrair sífilis se:

- Fizer sexo sem camisinha de látex ou poliuretano.
- Tiver vários parceiros sexuais.
- Já tiver o VIH ou outra IST.
- Fizer sexo sob influência de drogas ou álcool, pois a chance de usar a camisinha é menor nesses casos.

Quem pode pegar sífilis?

Qualquer pessoa sexualmente ativa pode pegar sífilis. Fazer sexo sem proteção (sem usar camisinha) aumenta a chance de pegar sífilis. Embora tanto homens quanto mulheres possam ser infectados, mais da metade dos casos reportados nos EUA são de homens que fizeram sexo com outros homens.

Quais são os sintomas da sífilis?

Os sintomas podem ser diferentes, dependendo do estágio da doença. A sífilis tem quatro estágios: primário, secundário, latente e terciário.

Sintomas do estágio primário

- Uma ou mais feridas indolores (cancros) nos genitais, na boca, no ânus ou no reto.
- A ferida dura de 3 a 6 semanas e some sozinha. Porém, caso você não comece o tratamento, a doença avança para o estágio seguinte.

Sintomas do estágio secundário

- Erupções cutâneas nas mãos, nos pés ou em outras partes do corpo. Essas erupções geralmente são vermelhas ou marrons e não provocam coceira.
- Os outros sintomas incluem febre, dor de garganta, dores musculares, perda de cabelo e sensação de cansaço. Esses sintomas desaparecem sozinhos, porém, caso você não comece o tratamento, a doença avança para o estágio seguinte.

Sintomas do estágio latente

- Não aparece nenhum sintoma, mas a doença pode ser detectada por um exame de sangue. Esse estágio pode durar por muitos anos.

Sintomas do estágio terciário

- Os sintomas incluem dificuldade de movimentação dos braços e das pernas, paralisia, entorpecimento, cegueira e problemas no coração.

Por quanto tempo uma pessoa infectada transmite a sífilis?

Pessoas que não realizam o tratamento são mais prováveis transmitirem a doença durante o primeiro ano da infecção. Quanto mais tempo uma pessoa fica sem tratamento, maior o risco de desenvolver problemas a longo prazo.

Como eu descubro se tenho sífilis?

A única forma de ter certeza se você tem sífilis é fazendo um exame. Geralmente, o médico pede um exame de sangue para detectar a doença. Como a sífilis pode causar problemas para o feto, todas as mulheres grávidas devem fazer o exame. Pessoas cujas atividades sexuais as coloquem em um grupo de risco devem fazer exames regularmente para que a doença possa ser tratada o mais rápido possível.

Onde eu faço os exames?

A maioria dos médicos faz os exames de sífilis e de outras ISTs. Caso precise de um médico, chame a Linha de Saúde do Prefeito em 617-534-5050. Ou acesse <http://www.hivtest.org/STDTesting.aspx>.

